

LE RIUNITE

CALENDARIO PER LA DIFESA DELL'ALBICOCCO

- **CADUTA FOGLIE**

CONTRO CANCRI, GOMMOSI E SECCUME DEI RAMI

CUPROSSIL IDRO WP	500 g/100 l oppure
FLOWBRIX BLU	400 g/100 l oppure
RAME CAFFARO BLU	500 g/100 l oppure
POLTIGLIA BORDOLESE	1 Kg/100l

- **FINE POTATURA**

CONTRO BOLLA E CANCRI RAMEALI

per disinfettare i tagli conseguenti alle operazioni di potatura

CUPROSSIL IDRO WP	500 g/100 l oppure
FLOWBRIX BLU	400 g/100 l oppure
RAME CAFFARO BLU	500 g/100 l oppure
POLTIGLIA BORDOLESE	1 Kg/100l

in questa fase si può intervenire a distanza di 10/15 giorni anche CONTRO LA COCCINIGLIA ALBENE 3000ml/100 l

- **PRE FIORITURA**

per proteggere il fiore dall'attacco di funghi (MONILIA) e favorire allegagione:

KEETON 25 WG	80 gr/100 l oppure
DUAXO	300ml/100l oppure
SWITCH	60 gr /100 l +
AXIBOR 110	120 ml/100 l

In caso di pioggia o umidità elevata ripetere il trattamento dopo 7 10 gg

- **DALLA SCAMICIATURA DEL FIORE FINO A MATURAZIONE**

iniziare trattamenti contro CLADOSPORIUM (RUGGINE), CORINEO E OIDIO (MAL BIANCO) e concimazione fogliare per migliorare pezzatura e grado zuccherino del frutto

TIOWETTING DF	300 g/100 l +
FRUTTAFLOR PK	250 g/100 l +
FITOSTIM	250 ml/100 l

questo trattamento va ripetuto ogni 15/20 gg. sino a 10 giorni dalla raccolta

- **DA INVAIATURA A MATURAZIONE**

Per migliorare colore, aroma e consistenza della polpa aggiungere AXICAL 100 ml /100 l

Possono essere utili trattamenti CONTRO MONILIA E MARCIUME DEI FRUTTI

ARMICARB	350 gr/100 l oppure
TELDOR PLUS	100 gr/100 l oppure
EMERALD	100ml/100l

in caso di infestazione trattare CONTRO CIDIA, MOSCA, MOSCERINO GIAPPONESE

EPIK SL	150 ml/100l oppure
DECIS HOBBY	50 ml/100l oppure

NB – utilizzare i prodotti SECONDO LE MODALITA' E NEL RISPETTO DELL'INTERVALLO DI SICUREZZA RIPORTATO IN ETICHETTA – VERIFICARE SEMPRE CON ATTENZIONE L'ETICHETTA