

CALENDARIO PER LA DIFESA DEL MELO E DEL PERO

CADUTA FOGLIE

CONTRO CANCRI E SECCUME DEI RAMI:

(in caso di infezioni in corso, effettuare 2 trattamenti ad inizio e a fine caduta foglie)

| | |
|------------------------|------------|
| CUPROSSIL IDRO WP | 500g/100 l |
| oppure RAME CAFFARO WG | 500g/100 l |

FINE POTATURA

per disinfettare i tagli e le ferite conseguenti alle operazioni di potatura usare uno dei seguenti prodotti:

| | |
|---------------------|-------------|
| CUPROSSIL IDRO WP | 500 g/100 l |
| FLOWBRIX BLU | 400 ml/100l |
| POLTIGLIA BORDOLESE | 1 Kg/100l |

in questa fase si può intervenire, dopo circa 10/15 giorni dal trattamento sopra indicato, anche CONTRO LA COCCINIGLIA:

| | |
|---------------|---------------|
| ALBENE | 3000 ml/100 l |
| AFIDINA QUICK | 130ml/100 l |
| oppure CATOR | 110ml / 100 l |

PRE FIORITURA

contro TICCHIALATURA E/O OIDIO (MAL BIANCO)

| | |
|-----------------|------------------|
| DODIPREV 35 | 150-200 ml/100 l |
| VISIR PENCHOTEC | 40 ml/100 l |
| oppure DOMARK | 20 ml/100 l |

DALLA SCAMICIATURA DEL FIORE FINO A INIZIO INVAIATURA DEL FRUTTO

trattamento preventivo CONTRO GLI AFIDI usare uno dei seguenti prodotti:

| | |
|----------|-------------------|
| MEDIATOR | 60 ml/100l oppure |
| EPIK SL | 150 ml/100l |

DA FRUTTO NOCE A INIZIO INVAIATURA DEL FRUTTO

trattamento contro CARPOCAPSA (farfalla) trattare ogni 15gg, alternando i seguenti prodotti:

| | |
|--------------|--------------|
| SPADA 200 EC | 250 ml/100 l |
| TUREX | 150 gr/100 l |
| LASER | 25 ml/100 l |

Per prevenire la **BUTTERATURA AMARA** del frutto, eseguire fino a 4 trattamenti anche in miscela con insetticida:

AXICAL 120 ml/100 l

Ripetere il trattamento per il controllo di TICCHIOLATURA e OIDIO, usare i prodotti indicati:

ARMICARB 300 gr/100 l oppure
oppure EMERALD 40EW 100ml/ 100 l

per migliorare la pezzatura e il grado zuccherino dei frutti, aggiungere ad ogni trattamento concimi fogliari contenenti fosforo e potassio

FRUTTAFLOR PK 250g/100 l

DA INIZIO INVAIATURA FINO A CIRCA 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

In caso di infestazione proseguire i trattamenti contro carpocapsa o mosca della frutta, con:

EPIK SL 100 - 150 ml/hl oppure
DECIS EVO 50 ml/100 l

NB - utilizzare i prodotti SECONDO LE MODALITA' E NEL RISPETTO DELL'INTERVALLO DI SICUREZZA RIPORTATO IN ETICHETTA

Se le piante presentano problemi potete portare dei campioni presso i punti vendita della Cooperativa, per avere un consiglio tecnico mirato.