














LE RIUNITE

CALENDARIO PER LA DIFESA DELLA VITE

FASE	AVVERSITA'	PRODOTTI CONSIGLIATI (dose per 100 litri di soluzione)	
0) prima del germogliamento	nottue	Turex 110 ml o Affirm 150 gr	
1) Germogliamento 	2) Foglie distese 	peronospora	
		escoriosi	Poliram DF 400 gr; Tiowetting 500 gr
		oidio	Tiowetting 300 gr
3) Grappoli visibili 	4) Grappoli separati 	peronospora	Foldim 150 gr; Erresei Albis 300 gr; Mexil r 400 ml; Cumeta 400 ml
		oidio	Prosper 130 ml; Duaxo 180 ml; Domark 25 ml
		nutrizione	Fruttaflor 20.20.20 250 gr + Fitostim Alga 100 ml
5) Prefioritura 	6) Fioritura 	peronospora	Foldim 150 gr; Erresei Albis 300 gr; Pergado 60 ml;
		oidio	Visir 30 ml + Tiowetting 300 gr; Duaxo 180 ml + Tiowetting 300 gr
		nutrizione	Axibor 120 ml; Fitostim Alga 100 ml
7) Fine fioritura 	8) Allegagione 	peronospora	Foldim 130 gr + Leimay 40ml; Pergado 60 ml; Erresei Albis 300 gr
		oidio	Cidely 20 ml; Duaxo 180 ml; Domark 25 ml
		cicaline e tignole	Epik SL 150 ml
		nutrizione	Aximag 100 gr + Fitostim Alga 100 ml
9) Accrescimento grappolo 		peronospora	Mexil R 400 ml; Ridomil R 400 ml; Cumeta 400 ml
		oidio	Visir 30 ml + Tiowetting df 300 gr; Emerald 100 ml; Domark 25 ml
		cicalina e tignola	Epik SL 150 ml
		nutrizione	Axical 100 ml + Fitostim Alga 100 ml + Stimox plus 250 ml
10) Prechiusura grappolo 		peronospora	Cimoram Ultra WG 300 gr; Cuprossil 250 gr; Tutor 500 gr; R6 Bordeaux 500 gr
		oidio	Cidely 20 ml; Duaxo 180 ml; Domark 200 ml
		botrite	Alef 150 ml; Switch 80gr; Armicarb 350 gr
		nutrizione	Axical 100 ml + Fitostim Alga 100 ml + Stimox plus 250 ml
11) da invaiatura a maturazione 		peronospora	Cimoram Ultra WG 300 gr; Tutor 500 gr; Cuprossil 250 gr;
		oidio	Tiowetting 400 gr; Armicarb 350 gr
		botrite	Switch 80 gr; Armicarb 350 gr
		cicalina e tignola	Lince 100 ml
		nutrizione	Fitostim Alga + Fruttaflor PK 250 gr
12) dopo vendemmia		nutrizione	Fruttaflor PK 250 gr
		oidio	Visir 30 ml;

ATTENZIONE: LE CICALINE (*Scaphoideus titanus*) RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE DELLA MORIA DELLA VITE (FLAVESCENTZA DORATA) sono assolutamente da combattere con almeno 2 trattamenti il primo verso la metà giugno il secondo intorno al 10 luglio. Per l'esatta collocazione del trattamento è opportuno seguire gli appositi bollettini regionali.